




GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais - CEGdRA

RELATÓRIO DE QUEIMADAS ESTADO DO ACRE



UNIDADE DE SITUAÇÃO
MONITORAMENTO
HIDROMETEOROLÓGICO

SEMA | IMC

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais - CEGdRA

Presidente da Comissão
Geraldo Israel Milani de Nogueira

UNIDADE DE SITUAÇÃO

MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

Este monitoramento tem como objetivo apresentar dados referentes às queimadas e aos incêndios florestais na Amazônia Legal e no Estado do Acre, usando o Satélite de Referência AQUA MT-INPE. Este relatório contém o resumo diário do monitoramento de focos de queimadas, risco de fogo no estado do Acre, segundo dados do CPTEC/ INPE.

Coordenação
Vera Lúcia Reis Brown

Elaboração
Tatiane Mendonça de Lima
Ylza Marluce Silva de Lima
Alan dos Santos Pimentel
Camila do Nascimento
Marinho

Colaboradores
Edvaldo de Araujo Paiva
James Joyce Bezerra Gomes

Instituições Parceiras
INPE, CEMADEN, CBMAC,
UFAC, CPTEC, SIPAM, ANA



cegdra@gmail.com



3213-3122



Rua das Acáias nº 279 Distrito Industrial
CEP 69920-175 - Rio Branco
Acre - Brasil

Realização
SEMA/IMC

Apoio
FUNTAC

Nº015
25/06/2019


www.imc.ac.gov.br



1. Monitoramento de focos de queimadas – Amazônia Legal


A Figura 1 apresenta o acumulado de focos de queimadas na Amazônia Legal, do início do ano (**01/01/2019**) até ontem (**24/06/2019**). Foram registrados **15.396** focos de queimadas segundo o satélite de referência (AQUA_M-T), dos quais 38,7% localizam-se no estado do Mato Grosso (5.961), 29,9% em Roraima (4.600) e 14,5% em Tocantins (2.227). O Acre ocupa o 8º lugar no ranque, com 80 focos de queimadas (0,5%).

Figura 1 – Distribuição percentual dos focos de queimadas acumulados em **01/01/2019** a **24/06/2019** na Amazônia legal
(Satélite de Referência AQUA Tarde)



A Figura 2 indica o quantitativo de focos de queimadas, a partir do satélite de referência (AQUA_M-T), acumulados por estado, entre os dias **01/01** e **24/06** de cada ano (2005, 2010, 2016, 2018 e 2019).

Figura 2 – Distribuição comparativa dos focos de queimadas acumulados de **01/01/2019** a **24/06/2019** na Amazônia legal, nos anos de 2005, 2010, 2016, 2018 e 2019 (Satélite de Referência AQUA Tarde)




Fonte: INPE



2. Monitoramento de focos de queimadas – Estado do Acre


A **Figura 3** demonstra o acumulado de focos de queimadas no estado do Acre, entre início do ano (**01/01/2019**) e ontem (**24/06/2019**). Foram registrados **80** focos, segundo dados do satélite de referência (AQUA_M-T). Os municípios de Tarauacá e Rio Branco foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados no período.

Figura 3 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados de **01/01/2019** a **24/06/2019**, no Estado do Acre.
(Satélite de referência AQUA_M-T)



O gráfico da **Figura 4** abaixo representa os focos de queimadas acumulados de junho (**01/06/2019**) até ontem (**24/06/2019**). O quantitativo corresponde a **37** focos, segundo os dados do satélite de referência (AQUA_M-T). Os municípios de Tarauacá e Mâncio Lima lideram o ranque com maior acumulado de focos de queimadas.

Figura 4 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados no mês Junho de **01/06/2019** a **24/06/2019**.
(Satélite de referência AQUA_M-T)






A **Figura 5** indica a consolidação do acumulado de focos de queimadas desde o início do ano (**01/01/2019**) até ontem (**24/06/2019**) por classe fundiária. A análise indica maior ocorrência de queimadas nas áreas de **Projetos de Assentamento e Áreas Discriminadas**.

Figura 5 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados de **01/01/2019** a **24/06/2019** por classe fundiária
(Satélite de referência AQUA_M-T)

Focos acumulados por classe fundiária no estado do Acre		
	Acumulados do mês Junho	Acumulados no ano
Área sem Estudo Discriminatório	6	7
Área Arrecadada	1	2
Projetos de Assentamento	10	28
Áreas Discriminadas	11	20
Propriedades Particulares	2	12
Terra Indígena	2	2
Unidade de Conservação	5	9

A **Figura 6** a seguir indica que, do início do ano (**01/01/2019**) até ontem (**24/06/2019**), o município de **Tarauacá** apresentou maior acumulado de focos de queimadas, entretanto o município de **Brasileia** e **Acrelândia** registraram o maior número de focos por Km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios. Neste sentido, o município de **Brasileia** e **Acrelândia** tornam-se prioritários para ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais.

Figura 6 – Ocorrência de focos de queimadas e densidade por km², por município em **01/01/2019** a **24/06/2019**
(Satélite de referência AQUA_M-T)



Fonte: INPE



3. Monitoramento de focos de queimadas nas Unidades de Conservação

A tabela da **Figura 7** é a consolidação do acumulado do início deste ano (**01/01/2019**) até ontem (**24/06/2019**) por Áreas Naturais Protegidas. A análise indica maior ocorrência de focos na **Reserva Extrativista Chico Mendes** e **Reserva Extrativista do Alto Juruá**.

Figura 7 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados de **01/01/2019** a **24/06/2019**.


Focos Acumulados - Áreas Naturais Protegidas		
Nome	Acumulados do mês (JUN)	Acumulados no ano
Reserva Extrativista do Alto Juruá	2	2
Reserva Extrativista do Alto Tarauacá	0	0
Área de Proteção Ambiental Amapá	0	1
Reserva Extrativista Cazumbá - Iracema	0	0
Parque Estadual Chandless	0	0
Reserva Extrativista Chico Mendes	2	5
Floresta Estadual do Antimary	0	0
Área de Proteção Ambiental Irineu Serra	0	0
Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim Pentecoste	0	0
Floresta Nacional Macauã	0	0
Floresta Estadual Mogno	0	0
Estação Ecológica Rio Acre	0	0
Floresta Estadual Rio Gregório	0	0
Floresta Estadual Rio Liberdade	0	0
Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade	0	0
Floresta Nacional Santa Rosa do Purus	1	1
Floresta Nacional São Francisco	0	0
Área de Proteção Ambiental São Francisco	0	0
Área de Relevante Interesse Ecológico Seringal Nova Esperança	0	0
Parque Nacional Serra do Divisor	0	0



4. Risco de Fogo Observado

O princípio do Risco de Fogo (RF) é o de que quanto mais dias seguidos sem chuva em um local, maior o risco de queima da sua vegetação. Adicionalmente, são incluídos no cálculo os efeitos do tipo da vegetação e do ciclo natural de seu desfolhamento, da temperatura máxima e umidade relativa mínima do ar diária, assim como a presença de fogo na área de interesse (INPE).

Figura 8 – Mapa de classificação do risco de fogo observado no estado do Acre.



O mapa da **Figura 8** apresenta a consolidação do risco de fogo observado ontem (**24/06/2019**) no estado do Acre. A Plataforma de monitoramento ambiental TerraMA² realiza o cálculo do risco de fogo para cada município e classifica de acordo com a legenda acima indicada.


O **risco de fogo mínimo** foi observado nos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Santa Rosa do Purus. O risco de fogo **médio** pode ser visualizado em boa parte do Estado. E no município de Brasileia houve risco de fogo **alto** e nos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro e Acrelândia houve indicativo de risco de fogo a **crítico**.



5. Qualidade do Ar

A concentração de PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) para cada localidade é estimado no primeiro nível do modelo, ou seja, o nível em que vive o ser humano. As máximas concentrações de PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) estão associadas às regiões urbanas devido às fontes veiculares e indústrias e regiões com focos de queimadas e incêndios florestais.

Figura 9 – Mapa de material Particulado CPTEC/INPE em 25/06/2019



A **Figura 9** mostra a previsão, por modelo numérico, da concentração de material particulado no dia **25/06/2019** até as **09h00**, com valores variando de 10 a 80 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Nos municípios que compõem o **Oeste** apresentam *Boas* condições e o **Leste** varia de *Boas* condições a *Moderada*. Para a Organização Mundial de Saúde – OMS o limite é de 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para partículas de até 2,5 $\mu\text{m}/\text{m}^2$.

O modelo acima indica que **4754 toneladas de monóxido de carbono (CO)** foram emitidas por queimadas e fontes urbano/industriais no **Acre** no dia **24/06/2019**.


(<http://meioambiente.cptec.inpe.br/>).



6. Qualidade do Ar Observada

O gráfico da **Figura 10** demonstra a média de concentração de PM 2,5 micrograma por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) observada ontem (**24/06/2019**) no estado do Acre. As leituras foram obtidas através de equipamento de monitoramento da qualidade do ar disponibilizado pelo Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre – UFAC, a partir dos sensores instalados pelo Ministério Público do Estado do Acre - MPAC, cujos dados podem ser acessados no sítio www.purpleair.com.

Figura 10 – Concentração média diária observada de poluentes PM 2,5 micrograma por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) em **24/06/2019**.




OBSERVAÇÃO: Nos pontos de monitoramento com informação disponível, a qualidade do ar observada foi satisfatória, sem riscos para a saúde humana.



7. Qualidade do Ar - Rio Branco

O gráfico da **Figura 11** demonstra a concentração de PM 2,5 às 09h00 do dia anterior (**24/06/2019**) até 09h00 dia atual (**25/06/2019**) na área urbana do município de Rio Branco. As leituras foram obtidas através de equipamento de monitoramento da qualidade do ar disponibilizado pelo Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre – UFAC, cujos dados podem ser acessados no sítio www.purpleair.com.

Figura 11 – Gráfico de material Particulado PM 2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



No dia **25/06/2019**, a **máxima concentração de material particulado** ocorreu às 01h10m, com valor de **69.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , de acordo com o sensor instalado na Universidade Federal do Acre. Enquanto o sensor localizado na sede do Ministério Público, a **máxima concentração de material particulado** ocorreu às 06h55m, com valor de **24.57 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** registrado ontem **25/06**.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency – EPA), a concentração média de PM2.5 superiores a valores de 89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ em 1-3 horas já são considerados nocivos a grupos de risco (pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idoso e crianças).

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS o limite é de 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para partículas de até 2,5 $\mu\text{m}/\text{m}^2$, na média, para 24 horas de exposição e de 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para média anual.



8. Glossário

Siglas Institucionais

- CEMADEN** – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
- CPTEC** – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
- ESA** - Agência Espacial Europeia
- GTPCS** - Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal
- INPE** – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- MCTIC** - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- NOAA** - Administração Oceânica e Atmosférica Nacional
- OMS** - Organização Mundial de Saúde

Siglas Técnicas

- AQUA_M-T** - Satélite cujos dados diários de focos detectados são usados para compor a série temporal ao longo dos anos
- ISS** - Índice Integrado de Seca
- MSI** - Sistema de Captação de Imagens Multiespectrais
- PM2.5** – Material fino particulado
- PRODES** - Sistema de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal
- RF** - Risco de Fogo
- TSM** - Temperatura da Superfície do Mar
- ZEE** - Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE
- µg/m³** – Micrômetro por metro cúbico