


MONITORAMENTO QUEIMADAS



UNIDADE DE SITUAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO

Este relatório tem como objetivo apresentar dados referentes às queimadas na Amazônia Legal e no Estado do Acre contemplando o monitoramento da seca, risco de fogo, avaliação de áreas queimadas em perímetro urbano, acompanhamento de fumaça e poluição atmosférica.

Israel Milani
Secretário de Estado de Meio Ambiente

Coordenação

Vera Lúcia Reis Brown

Elaboração

Antonio Marcos
Camila do Nascimento Marinho
Elaine Lopes
Tatiane Mendonça
Valmira Domingos de Oliveira
Ylza Marluce Silva de Lima

Colaboradores

Alan dos Santos Pimentel
James Joyce Bezerra Gomes

Instituições Parceiras

INPE, CEMADEN, CBMAC,
UFAC, CPTEC, SIPAM, ANA

Realização

SEMA

Apoio

FUNTAC



cegdra@gmail.com



3213-3122




Rua das Acácias nº 279 Distrito Industrial
CEP 69920-175 Rio Branco
Acre - Brasil

FOCOS DE QUEIMADAS – AMAZÔNIA LEGAL

A **Figura 1** apresenta o acumulado de focos de queimadas na Amazônia Legal, do início do ano (**01/01/2019**) até ontem (**27/08/2019**). Foram registrados **59.412** focos de queimadas segundo o satélite de referência (AQUA TARDE), dos quais 26.2% localizavam-se no estado do Mato Grosso (15.594), 18.7% em Pará (11.118) e 13.2% em Amazonas (7.842). O Acre ocupa o 8º lugar no ranque, com 2.920 focos de queimadas (4.9%). (CPTEC/INPE, 2019).


Figura 1 – Distribuição percentual dos focos de queimadas acumulados em **01/01/2019** a **27/08/2019** na Amazônia legal (Satélite de Referência AQUA Tarde)



Fonte: INPE

A **Figura 2** indica o quantitativo de focos de queimadas, a partir do satélite de referência (AQUA TARDE), acumulados por estado, entre os dias **01/01** e **27/08** de cada ano (2005, 2010, 2016, 2018 e 2019).

Figura 2 – Distribuição comparativa dos focos de queimadas acumulados de **01/01** a **27/08** na Amazônia legal, nos anos de 2005, 2010, 2016, 2018 e 2019 (Satélite de Referência AQUA Tarde)




Fonte: INPE

FOCOS DE QUEIMADAS – ACRE

A **Figura 3** demonstra o acumulado de focos de queimadas no estado do Acre, entre o início do ano (01/01/2019) e ontem (27/08/2019). Foram registrados **2.920 focos**, segundo dados do satélite de referência (AQUA-TARDE). Os municípios de Feijó, Tarauacá e Sena Madureira foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados no período (CPTEC/INPE, 2019).


Figura 3 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados de 01/01/2019 a 27/08/2019, no Estado do Acre. (Satélite de referência AQUA TARDE)



Fonte: INPE

A **Figura 4** abaixo representa os focos de queimadas acumulados de agosto (01/08/2019) até ontem (27/08/2019). O quantitativo correspondeu a **2.545 focos**, segundo os dados do satélite de referência (AQUA TARDE). Os municípios de Feijó, Tarauacá e Sena Madureira lideraram o ranque com maior acumulado de focos de queimadas. (CPTEC/INPE, 2019).

Figura 4 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados no mês Agosto de 01/08/2019 a 27/08/2019. (Satélite de referência AQUA TARDE)



Fonte: INPE

***Nota:** Os valores referentes aos dados de focos de queimadas (Todos os satélites) são superestimados em função de o mesmo ponto de foco de queimada ser detectado por mais de um satélite em diferentes horários de passagens, o Satélite de Referência (Aqua Tarde) passa diariamente no fim da Tarde, cobrindo o território do estado do Acre.

FOCOS DE QUEIMADAS – ACRE


A **Figura 5** indica a consolidação do acumulado de focos de queimadas desde o início do ano (**01/01/2019**) até ontem (**27/08/2019**) por classe fundiária, segundo dados do satélite de referência (AQUA_TARDE). A análise indica maior ocorrência de queimadas nas áreas de **Propriedades Particulares, Áreas Discriminadas e Projetos de Assentamento**.

Figura 5 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados de **01/01/2019** a **27/08/2019** por classe fundiária (Satélite de referência AQUA_TARDE)

| Focos acumulados por classe fundiária no estado do Acre | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| | Acumulados do mês Agosto | Acumulados no ano |
| Área sem Estudo Discriminatório | 311 | 340 |
| Área Arrecadada | 74 | 90 |
| Projetos de Assentamento | 467 | 565 |
| Áreas Discriminadas | 596 | 690 |
| Propriedades Particulares | 657 | 724 |
| Terra Indígena | 127 | 141 |
| Unidade de Conservação | 313 | 370 |

A **Figura 6** a seguir indica que, do início do ano (**01/01/2019**) até ontem (**27/08/2019**), o município de **Feijó** apresentou maior acumulado de focos de queimadas, entretanto os municípios de **Acrelândia** e **Capixaba** registraram o maior número de focos por Km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios. Neste sentido, o município de **Acrelândia** e **Capixaba** tornam-se prioritários para ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais.

Figura 6 – Ocorrência de focos de queimadas e densidade por km², por município em **01/01/2019** a **27/08/2019** (Satélite de referência AQUA_TARDE)



FOCOS DE QUEIMADAS – ACRE

Monitoramento de focos de queimadas nas Unidades de Conservação

A tabela da **Figura 7** é a consolidação do acumulado do início deste ano (**01/01/2019**) até ontem (**27/08/2019**) por Áreas Naturais Protegidas, segundo dados do **Satélite de Referência (AQUA Tarde)**. A análise indica maior ocorrência de focos na **Reserva Extrativista Chico Mendes** e **Reserva Extrativista do Alto Juruá**.


Figura 7 – Distribuição dos focos de queimadas acumulados de **01/01/2019** a **27/08/2019**.

| Focos Acumulados - Áreas Naturais Protegidas | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Nome | Acumulados do mês (AGO) | Acumulados no ano |
| Reserva Extrativista do Alto Juruá | 53 | 57 |
| Reserva Extrativista do Alto Tarauacá | 6 | 7 |
| Área de Proteção Ambiental Amapá | 2 | 3 |
| Reserva Extrativista Cazumbá - Iracema | 8 | 11 |
| Parque Estadual Chandless | 0 | 0 |
| Reserva Extrativista Chico Mendes | 128 | 163 |
| Floresta Estadual do Antimary | 23 | 25 |
| Área de Proteção Ambiental Irineu Serra | 0 | 0 |
| Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim Pentecoste | 0 | 0 |
| Floresta Nacional Macauã | 0 | 0 |
| Floresta Estadual Mogno | 9 | 10 |
| Estação Ecológica Rio Acre | 0 | 0 |
| Floresta Estadual Rio Gregório | 17 | 23 |
| Floresta Estadual Rio Liberdade | 14 | 14 |
| Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade | 22 | 24 |
| Floresta Nacional Santa Rosa do Purus | 3 | 4 |
| Floresta Nacional São Francisco | 0 | 0 |
| Área de Proteção Ambiental São Francisco | 3 | 4 |
| Área de Relevante Interesse Ecológico Seringal Nova Esperança | 0 | 0 |
| Parque Nacional Serra do Divisor | 25 | 25 |

RISCO DE FOGO PREVISTO

A **Figura 8** é a consolidação da previsão do risco de fogo válido para hoje (**28/08/2019**). O princípio do Risco de Fogo é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação (INPE).

Figura 8 – Risco de Fogo para o estado do Acre em **28/08/2019**




O risco de fogo **mínimo** e **baixo** deve predominar em quase todo estado. O risco **médio** é previsto em partes do Oeste e Leste. O risco de fogo **alto** a **crítico** é previsto em pontos isolados da Regional do Purus, Juruá e Baixo Acre.

Qualidade do Ar

A concentração de PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) para cada localidade é estimado no primeiro nível do modelo, ou seja, o nível em que vive o ser humano. As máximas concentrações de PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) estão associadas às regiões urbanas devido às fontes veiculares e indústrias e regiões com focos de queimadas e incêndios florestais.

Figura 9 – Mapa de material Particulado CPTEC/INPE em 28/08/2019



A **Figura 9** mostra a previsão, por modelo numérico, da concentração de material particulado no dia **28/08/2019** até as **09h00**, com valores variando de 25 a 120 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Nos municípios que compõem o **Oeste e Leste** apresentam condições que variam de *Boa* a *Ruim*. Para a Organização Mundial de Saúde – OMS o limite é de 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para partículas de até 2,5 $\mu\text{m}/\text{m}^2$.


O modelo acima indica que **26.281 toneladas de monóxido de carbono (CO)** foram emitidas por queimadas e fontes urbano/industriais no **Acre** no dia **27/08/2019**.

(<http://meioambiente.cptec.inpe.br/>).

Qualidade do Ar - Rio Branco

O gráfico da **Figura 10** demonstra a concentração de PM 2,5 às 09h00 do dia anterior (**27/08/2019**) até 09h00 do dia atual (**28/08/2019**) na área urbana do município de Rio Branco. As leituras foram obtidas através de equipamento de monitoramento da qualidade do ar disponibilizado pelo Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre – UFAC, parte da Rede de Monitoramento da Qualidade do AR estabelecida pelo Ministério Público do Estado do ACRE - MPAC e cujos dados podem ser acessados no sítio www.purpleair.com.

Figura 10 – Gráfico de material Particulado PM 2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



No dia **27/08/2019**, a **máxima concentração de material particulado** ocorreu às 21h35m, com valor de **34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$** , de acordo com o sensor instalado na Universidade Federal do Acre.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency – EPA), a concentração média de PM2.5 superiores a valores de 89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ em 1-3 horas já são considerados nocivos a grupos de risco (pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idoso e crianças).

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS o limite é de 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para partículas de até 2,5 μm^2 , na média, para 24 horas de exposição e de 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para média anual.

GLOSSÁRIO

SIGLAS INSTITUCIONAIS

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais

CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

ESA - Agência Espacial Europeia

GTPCS - Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

NOAA - Administração Oceânica e Atmosférica Nacional

OMS - Organização Mundial de Saúde

SIGLAS TÉCNICAS

AQUA_M-T - Satélite cujos dados diários de focos detectados são usados para compor a série temporal ao longo dos anos

ISS - Índice Integrado de Seca

MSI - Sistema de Captação de Imagens Multiespectrais

PM2.5 – Material fino particulado

PRODES - Sistema de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal

RF - Risco de Fogo

TSM - Temperatura da Superfície do Mar

ZEE - Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ – Micrômetro por metro cúbico